

نشرة معلومات للمريض

دياموكس® 250 SR ملغ كبسولات للإفراج الطويل

أسيتازولاميد

Diamox SR® 250mg Prolonged-release Capsules

Acetazolamide

إقرأ/ي جميع هذه النشرة بعناية قبل ان تبدأ/ي بتناول هذا الدواء. حافظ/ي على هذه النشرة. قد تحتاج/ين لقراءتها مجدداً. إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى, اسأل/ي الطبيب او الصيدلي. لقد تم وصف هذا الدواء لك. لا تقم/ تقومي بإعطائه للآخرين. فقد يضرهم ذلك, حتى وإن كانت أعراضهم تشبه التي لديك. إذا تفاقمت أي من الأعراض الجانبية, او إذا لاحظت/ي أي أعراض جانبية غي مُدرجة في هذه النشرة, رجاءً أخبر/ي الطبيب او الصيدلي.

اسم الدواء دياموكس 250 SR ملغ كبسولات للإفراج الطويل. سيتم الإشارة إليه من الآن فصاعداً بكبسولات دياموكس SR لتسهيل الاستخدام.

في هذه النشرة:

1. ما هي كبسولات دياموكس SR ولماذا تستخدم
2. قبل ان تتناول/ي كبسولات دياموكس SR
3. كيف تتناول/ين كبسولات دياموكس SR
4. أعراض جانبية محتملة
5. كيف تخزن/ي كبسولات دياموكس SR
6. معلومات إضافية

1. ما هي كبسولات دياموكس SR ولماذا تستخدم

دياموكس 250 SR ملغ كبسولات للإفراج الطويل تحتوي على المادة الفعالة أسيتازولاميد. وهي تنتمي الى مجموعة الأدوية التي تعرف بمثبطات الانهيدراز الكربونية.

كبسولات دياموكس SR تستخدم لعلاج, الزرق (علة في العين), عن طريق تخفيف الضغط داخل العين.

2. قبل ان تتناول/ي كبسولات دياموكس SR

لا تتناول/ي كبسولات دياموكس SR إذا:

- كنت تعلم/ي ان لديك حساسية لسولفوناميدات, مشتقات سولفوناميد تشمل أسيتازولاميد او لأي المركبات في الكبسولات (الدرجة في قسم 6 في نهاية النشرة)
- كان لديك مشاكل كبد بالغة
- لديك او كانت لديك مرة في السابق مشاكل كلى بالغة
- كان لديك نوع معين من الزرق يعرف بزرق إندساد الزاوية غير إحتقاني مزمن (سوف يكون باستطاعة الطبيب إرشادك)
- كان لديك إنخفاض في وظيفة الغدد الكظرية - الغدد فوق الكليتين - (أيضاً يعرف باسم مرض أديسون)
- كان لديك مستويات صوديوم منخفضة في الدم و/او بوتاسيوم او مستويات كلور مرتفعة في الدم (سوف يقوم الطبيب بإرشادك)
- كان الشخص الذي تم وصف هذا الدواء له دون سن 12 سنة.

لا ينبغي استخدام كبسولات دياموكس SR لدى الأطفال.

قم/قومي بمراجعة الطبيب إذا كان ينطبق عليك أي من المذكور أعلاه.

الزم/ي عناية خاصة وراجع/ي الطبيب قبل ان تتناول/ي كبسولات دياموكس SR إذا:

- لديك او كان لديك مرّة في السابق مشاكل كلى مثل حصى الكلى
- كان لديك مشاكل في الرئة مثل التهاب شعب هوائية مزمن او نفاخ رئوي، الذي يسبب صعوبة في التنفس
- كان لديك سُكري او مشاكل في مستوى السكر في الدم
- انت فوق سن ال- 65
- عدد قليل من الأشخاص المعالجين بمضادات الصرع مثل أسيتازولاميد كانت لديهم أفكار في إيذاء او قتل أنفسهم، إذا راودتك هذه الأفكار في أي لحظة، قم/ قومي بمراجعة الطبيب فوراً.

تناول أدوية أخرى:

رجاءً أخبر/ي الطبيب او الصيدلي إذا كنت تتناول/ين او إذا تناولت/ي مؤخراً أي أدوية أخرى، تشمل أدوية مقتناه دون وصفة طبية. التأثيرات لأي من هذه الأدوية ممكن ان تتغير، خصوصاً إذا كنت تتناول/ين، او تستخدم/ين، أي من التالي:

- أدوية للقلب مثل غليكوسيدات للقلب (مثل ديجوكسين)
- أدوية لخفض ضغط الدم
- أدوية لتفجير الدم (مثل وارفارين)
- أدوية مضادة للسكري لتخفيف السكر في الدم (مثل ميتفورمين)
- أدوية للصرع او للنوبات (تحديداً، فنيوتين، بريميدون او كاربامازيبين او توبيراميت)
- أدوية التي تتعارض مع حمض الفوليك، مثل ميتوتريكسات، بيريميثامين، او تريميثوبريم
- ستيرويدات مثل بريدنيزولون
- الأسبرين والأدوية ذات الصلة، مثل حمض الساليسيليك، او سالييسيلات الكولين لتقرحات الفم
- أدوية أخرى من مجموعة الأدوية التي تدعى مثبطات الأنهيدراز الكربونية (تستخدم لعلاج ارتفاع الضغط في العين (العينين))
- مقويات (منبهة)، كينيدين (يعالج دقات قلب غير منتظمة)، ميثينامين (يمنع عدى البول) او ليثيوم (يعالج مشاكل عقلية بالغة)
- علاج بيكربونات الصوديوم (تستخدم لعلاج حالات وجود حامض زائد في الجسم)
- سيكلوسبورين (يستخدم بعد زراعات الأعضاء لكبح جهاز المناعة).

كبسولات دياموكس SR ممكن ان تؤثر على بعض الإختبارات الطبية. إذا قمت/ي بزيارة مستشفى او عيادة لأي إختبارات طبية، ينبغي ان تخبر/ي الطبيب المعالج بأنك تتناول/ين كبسولات دياموكس SR.

الحمل والإرضاع:

أطلي الإرشاد من الطبيب او الصيدلي قبل تناول أي أدوية.

لا ينبغي تناول كبسولات دياموكس SR إذا كنت حاملاً، تظنين انك حامل او تخططين للحمل. يمكن تناولها أثناء الإرضاع لكن فقط بإرشاد من الطبيب.

السياقة واستخدام الماكينات:

إذا كانت كبسولات دياموكس SR تجعلك تشعر/ين بنعاس او إرتباك ينبغي عليك ان لا تقود او تشغل الماكينات. كبسولات دياموكس SR يمكنها أحياناً ان تسبب قصر البصر؛ إذا حدث ذلك وشعرت/ي بعدم قدرتك على القيادة بأمان، ينبغي عليك التوقف عن السياقة ومراجعة الطبيب.

معلومات مهمة عن بعض مركبات كبسولات دياموكس SR:

يحتوي هذا الدواء على مركب أصفر غروب الشمس FCF (E110) والذي ممكن ان يسبب ردود فعل تحسسية.

3. كيف تتناول/ي كبسولات دياموكس SR

- تناول/ي دائماً العدد من الأقراص التي أخبرك الطبيب بتناولها. هذه المعلومات سوف تكون موجودة أيضاً على الملصق.
- الجرعة الإعتيادية الموصى بها هي 1 او 2 كبسولات في اليوم تؤخذ تماماً قبل او تماماً بعد الوجبة.
- ينبغي بلع كبسولات دياموكس SR كاملة مع شربة ماء. لا تقم/تقومي بمضغ او سحق الكبسولات.

- تختلف الجرعة من شخص لآخر تبعاً لحالتهم الصحية. إذا لم تكن/تكوني متأكد/ةً من عدد الكبسولات التي عليك تناولها أو متى عليك تناولها, إسأل/ي الصيدلي.
- قبل بدء وخلال العلاج سوف يقوم الطبيب بمراقبة دمك ليتأكد ان العلاج بكبسولات دياموكس SR ملائم لك.

لا يُنصح باستخدام كبسولات دياموكس SR لدى الأطفال.

إذا قمت/ي بتناول كبسولات دياموكس SR أكثر مما ينبغي:

إحصل/ي على مساعدة طبية فوراً, إما عن طريق الإتصال بالطبيب أو الذهاب الى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى. خذ/ي معك أي كبسولات متبقية وهذه النشرة لكي يتمكن الطاقم الطبي من معرفة تماماً ماذا قد تناولت/ي.

إذا نسيت/ي ان تتناول/ي كبسولات دياموكس SR:

ينبغي عليك ان تتناولها/لبها حالما تتذكر/ين. مع ذلك, إذا كان ذلك بظرف ساعتين من موعد جرعتك التالية ينبغي عليك ان تتجاهل الكبسولة التي نسيت/ي وتكمل/ي في تناول بقية الكبسولات خاصتك كالمعتاد. لا تقم/تقومي بتناول جرعة مضاعفة من الكبسولات للتعويض عن الجرعة التي نسيت/ي.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى عن هذه الكبسولات, إسأل/ي الطبيب أو الصيدلي.

4. أعراض جانبية محتملة

مثل جميع الأدوية, كبسولات دياموكس SR ممكن ان تسبب أعراض جانبية, بالرغم من انه قد لا يصاب بها الجميع. جميع الأدوية بإمكانها ان تسبب ردود فعل تحسسية على الرغم من ان ردود الفعل التحسسية الضارة نادرة جداً. أي أزيز فجائي, صعوبة في التنفس, تورم جفون العينين, الوجه أو الشفتين, طفح جلدي أو حكة (خصوصاً التي تؤثر على جميع الجسم) ينبغي إخبارها للطبيب فوراً.

أخبر/ي الطبيب فوراً إذا لاحظت/ي أي من الأعراض الجانبية التالية:

- حمى, نفضات حادة, قرحة في الحلق أو تقرحات في الفم
- كدمات أو بقع حمراء أو بنفسجية صغيرة على الجلد
- حالة شديدة للجلد التي ممكن ان تؤثر على الفم وأجزاء أخرى من الجسم. ممكن ان يتطور ذلك الى ردة فعل حادة للجلد التي تبدأ ببقع حمراء مؤلمة, بعدها بثور كبيرة وتنتهي بتقشر طبقات من الجلد, الفم, الأنف, العينين أو الأعضاء التناسلية. ممكن ان يصاحب ذلك حمى ونفضات, ألم عضلات والشعور العام بالمرض.
- ضعف أو شلل, وتوتر عضلي منخفض
- توجد لديك نوبات
- ألم أو حروق عند التبول, لديك صعوبة في التبول أو توقفت/ي عن التبول, أو لديك دم في البول
- برازك أسود اللون أو قطراني, أو إذا لاحظت/ي دم في برازك
- غثيان, تقيؤ, فقدان الشهية, الشعور العام بالمرض, حمى, حكة, إصفرار الجلد والعينين, وبول داكن اللون
- انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء. تعب, أوجاع رأس, تصاب بضيق النفس عند ممارسة النشاط الرياضي, دوار وشوحيبة اللون
- انخفاض في خلايا الدم البيضاء
- ترقق العظام عند استخدامه الى جانب أدوية التي تستخدم لعلاج النوبات/ الإختلاجات
- مشاكل كلي.

أخبر/ي طبيبك بأسرع وقت ممكن إذا لاحظت/ي أي من الأعراض الجانبية التالية:

- ألم في أسفل الظهر
- براز فاتح اللون.
- جلدك أو عينيك تبدو صفراء قليلاً.

ممكن أيضاً ان تختبر/ي التالي:

أعراض جانبية شائعة (ربما تحدث لدى أقل من 1 من بين 10 أشخاص) وهي

- صداع
- إسهال
- مرض أو الشعور بالمرض, فقدان الشهية, عطش, أو طعم معدني في الفم
- دوار, فقدان سيطرة كامل للأذرع أو السيقان
- تبدو محتقناً
- الحاجة للتبول أكثر مرات من المعتاد
- تعب أو هيجية
- الشعور بحماس زائد
- سكر دم منخفض
- نخز أو إخدراع في أصابع اليدين أو القدمين, أو برودة في الأطراف.

أعراض جانبية غير شائعة (ربما تحدث لدى أقل من 1 من بين 100 شخص) هي:

- اكتئاب
- نعاس أو إرتباك
- عدم الرغبة في الجماع
- طنين في الأذنين أو صعوبة في السمع
- قصر نظر مؤقت والذي يتراجع عند تخفيف الجرعة أو وقف العلاج.
- عدد صفيحات منخفض,
- نقص في إنتاج الخلايا المسؤولة عن تزويد المناعة وأيضاً
- مستويات بوتاسيوم منخفضة.

إذا قمت/ي بتناول كبسولات دياموكس SR لمدة طويلة يمكنها أحياناً أن تؤثر على كمية البوتاسيوم, أو الصوديوم في دمك. من المرجح أن يقوم الطبيب بإجراء إختبارات دم ليتأكد من عدم حدوث ذلك. ممكن ان تختبر/ي أيضاً ترقيق العظام أو خطر حصى الكلى مع العلاج طويل الأمد. ممكن ان يحدث أحياناً ارتفاع أو إنخفاض مستويات السكر في الدم.

إذا تفاقمت أي من الأعراض الجانبية, أو إذا لاحظت/ي أي أعراض جانبية غير مُدرجة في هذه النشرة, رجاءً أخبر/ي الطبيب أو الصيدلي.

التبليغ عن الأعراض الجانبية:

إذا أصبت/ي بأي أعراض جانبية, أخبر/ي الطبيب, الصيدلي أو الممرض. يشمل ذلك أي أعراض جانبية محتملة غير مُدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة الإسرائيلية

بتبليغك عن الأعراض الجانبية يمكنك المساعدة بتزويد معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.

5. كيف تخزن/ي كبسولات دياموكس SR

خزن/ي تحت درجة 30°C مئوية.

خزن/ي في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة.

أبق/ي هذا الدواء بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال.

لا تقم بإستخدامه بعد تاريخ إنتهاء الصلاحية. هذا التاريخ مطبوع على العلبة. تاريخ إنتهاء الصلاحية يشير الى آخر يوم في ذلك الشهر.

لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. إسأل/ي الصيدلي كيف يمكنك التخلص من الأدوية التي لم تعد تحتاجها. هذه الإجراءات سوف تساعد على حماية البيئة.

تذكر

هذا الدواء لك. فقط الطبيب يمكن ان يصفه لك. أبداً لا تقم بإعطاء هذا الدواء لشخص آخر; يمكنه ان يضرهم, حتى وإن كانت أعراضهم تبدو شبيهة لتلك التي لديك.

6. معلومات إضافية

ماذا تحتوي كبسولات دياموكس SR:

المادة الفعالة هي أسيتازولاميد. كل كبسولة تحتوي على 250 ملغ أسيتازولاميد. المركبات الأخرى هي سيلولوز بلوري مكروي (E460), سلفات لوريل الصوديوم, ماء مُنقى, إيثيل سيلولوز, هيدروكسي بروبيل ميثيل سيلولوز (E464), زيت معدني, خلطة صبغ PB-230005 برتقالية [هيدروكسي بروبيل سيلولوز, ثنائي أكسيد التيتانيوم و FD&C أصفر #6/ أصفر غروب الشمس FCF بحيرة الألومنيوم (درجة 15-18%), تالك و FD&C أصفر #6/ أصفر غروب الشمس FCF بحيرة الألومنيوم (درجة 38-42%)].

غلاف الكبسولة يحتوي على جيلاتين, ثنائي أكسيد التيتانيوم (E171), أصفر أكسيد الحديد (E172) وإرتروسين (E127).

كيف تبدو كبسولات دياموكس SR ومحتويات العبوة:

كبسولات دياموكس SR لديها تركيب شفاف وغطاء برتقالي, ومطبوع عليها 'GS 250' باللون الأسود. تأتي عادةً برزم فقاعية من 28 او 30 كبسولة, مع ان الكبسولات ممكن ان تكون متوفرة أيضاً في زجاجات 28, 100 او 500. ليست جميع أحجام الرزم ممكن ان تكون مسوقة.

المستورد:

بروفارم م.ض

ص.ب 4046،

زخرون يعكوف، 30900

رقم التصنيف: A70125-A