

דף מידע למטופל

קפסולות ציקלוסרין 250 מ"ג

Cycloserine

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה משום שהוא מכיל מידע חשוב.

- חשוב לשמור על עלון זה משום שיייתכן ויהיה צורך לקרוא בו שוב.
- אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך בלבד. אין להעבירה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה שסימני מחלתם דומים לאלה שלך.
- אם אתה חווה תסמינים כלשהם, היוועץ ברופא או ברוקח. אלה עלולים לכלול תופעות לוואי שאינן רשומות בעלון זה. ראה חלק 4.

מה בעלון זה

1. מהן קפסולות ציקלוסרין ולמה הן משמשות
2. מה עליך לדעת בטרם תיטול את קפסולות ציקלוסרין
3. כיצד ליטול קפסולות ציקלוסרין
4. תופעות לוואי אפשריות
5. כיצד לאחסן את קפסולות ציקלוסרין
6. תכולת האריזה ומידע נוסף

1. מהן קפסולות ציקלוסרין ולמה הן משמשות

קפסולות ציקלוסרין מכילות את המרכיב הפעיל ציקלוסרין, שהוא אנטיביוטיקה. בציקלוסרין נעשה שימוש לטיפול במחלת השחפת (TB) יחד עם תרופות אחרות. שימוש בתרופה נעשה גם לטיפול בזיהומים בדרכי השתן.

2. מה עליך לדעת בטרם תיטול את קפסולות ציקלוסרין

אין ליטול קפסולות ציקלוסרין אם:

- אתה רגיש לציקלוסרין או לכל אחד ממרכיבי תרופה זו (פירוט בחלק 6). תגובה אלרגית עלולה לכלול פריחה, גרד, קושי בנשימה או התנפחות של הפנים, השפתיים, הגרון או הלשון.

- אם אתה סובל מאפילפסיה

- אם אתה סובל מדיכאון

- אם אתה סובל מחרדה בדרגה גבוהה או פסיכוזה (מחשבות חריגות)

- אם אתה סובל ממחלת כליות חמורה

- אם אתה אלכוהוליסט

אזהרות ואמצעי זהירות

היוועץ ברופא או ברוקח טרם נטילת קפסולות ציקלוסרין, אם:

- אתה סובל מפורפיריה (הפרעה המשפיעה על תאי הדם האדומים)

אם אתה סובל מפורפיריה, אנא דווח זאת לרופא.

תרופות אחרות וקפסולות ציקלוסרין

דווח לרופא אם אתה נוטל או נטלת לאחרונה או עשוי ליטול תרופות אחרות כלשהן, כולל תרופות ללא מרשם.

במיוחד, יש לדון עם הרופא במקרה שאתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

Ethioamide, isoniazid (לטיפול בשחפת). ייתכן ועדיין תוכל ליטול קפסולות ציקלוסרין והרופא יוכל להחליט האם הן מתאימות לך.

קפסולות ציקלוסרין ואלכוהול

יש להימנע משתיית אלכוהול בזמן נטילת תרופה זו.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, חשוב להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת התרופה.

נהיגה ושימוש במכוונות

לקפסולות ציקלוסרין אין השפעה על יכולתך לנהוג או להשתמש במכוונות.

קפסולות ציקלוסרין מכילות (E110) sunset yellow ו-(E122) carmoisine

(E110) sunset yellow ו-(E122) carmoisine עלולים לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד ליטול קפסולות ציקלוסרין

יש להשתמש אך ורק על פי הוראות הרופא או הרוקח. יש לבדוק עם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח.

מינון

המינון המומלץ הוא 500 מ"ג עד 1 גרם ליום, בחלוקה למנות.

מבוגרים: המינון ההתחלתי המקובל למבוגרים הוא 250 מ"ג כל 12 שעות בשבועיים הראשונים.

המינון היומי המקסימלי הוא 1 גרם.

קשישים: מטופלים קשישים הסובלים ממחלת כליות יקבלו מינון מופחת.

שימוש בילדים

המינון ההתחלתי המקובל אצל ילדים הוא 10 מ"ג לכל קילוגרם משקל גוף ליום, ולאחר מכן מותאם בהתאם לתגובה.

את הקפסולות יש לבלוע בשלמותן עם מים.

במקרה של בליעת כמות גדולה מהמינון המומלץ של קפסולות ציקלוסרין, עליך

לגשת למחלקת המיון הקרובה או ליצור קשר עם הרופא באופן מיידי. עליך לקחת את אריזת התרופה איתך.

במקרה ושכחת ליטול את קפסולות ציקלוסרין במועד

במקרה שפיספסת את מועד נטילת התרופה, יש לקחת את המנה בהקדם האפשרי. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. אם פיספסת מספר מנות, יש לדווח לרופא.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, אנא פנה לרופא או לרוקח.

4. תופעות לוואי אפשריות

כמו בכל תרופה, קפסולות ציקלוסרין עלולות לגרום לתופעות לוואי, למרות שלא כולם עשויים לחוות אותן.

תופעות לוואי חמורות

כל התרופות עלולות לגרום לתגובות אלרגיות, למרות שתגובות אלרגיות חריפות במיוחד הן נדירות.
יש לדווח לרופא באופן מיידי אם אתה חווה צפצופים פתאומיים בנשימה, קושי בנשימה, התנפחות של העפעפיים, הפנים או השפתיים, פריחה או גרד, במיוחד כאלה המשפיעים על הגוף כולו.

אצל מטופלים המקבלים מינונים גבוהים יותר של ציקלוסרין דווחו התופעות הבאות:

- קוצר נשימה פתאומי (כשל לבבי)

- במטופלים המקבלים 4-6 קפסולות ציקלוסרין מידי יום (1.0-1.5 גרם מידי יום)

- קומה

- כאבי ראש חמורים

- תחושת נמנום או ישנוניות

- רעד

- סחרחורת

- בלבול

- אובדן זיכרון

- דיבור מעוות

- התקפים

- תחושת נימול בידיים ו/או בכפות הרגליים

- חוסר יכולת להשתמש בידיים או ברגליים

- שינויים באופי ובמצב הרוח כולל תחושה של עצבנות ואגרסיביות

דווח על תופעות לוואי

אם אתה חווה תופעות לוואי כלשהן, עליך לדווח לרופא או לרוקח. אלה עלולים לכלול תופעות לוואי שאינן רשומות בעלון זה.

על ידי דווח על תופעות לוואי אתה יכול לסייע לספק מידע נוסף על הבטיחות של תרופה זו.

5. כיצד לאחסן קפסולות ציקלוסרין?

יש לשמור את התרופה מחוץ להישג ידם או טווח ראייתם של ילדים.

אין להשתמש בתרופה זו לאחר תאריך התפוגה הרשום על התווית או האריזה אחרי EXP. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון בחודש המצויין. יש לאחסן קפסולות ציקלוסרין בטמפרטורה נמוכה מ 25⁰ צלסיוס. יש לשמור את הבקבוק סגור היטב להגנה מפני לחות. אין להשליך שאריות תרופה באמצעי סילוק האשפה הביתיים או דרך הביוב. היוועץ ברוקח בקשר לאופן בו יש להשליך תרופות שאין להן שימוש. אמצעים אלה יסייעו לשמירה על הסביבה.

6. תכולת האריזה ומידע נוסף

מה מכילות קפסולות ציקלוסרין

כל קפליה קשה מכילה 250 מ"ג של החומר הפעיל ציקלוסרין.

חומרים נוספים הם:

טאלק, sunset yellow FCF (E110) (ראה חלק 2) ו- Camoisine (E122), (ראה חלק 2), Erythrosin (E127), Titanium Dioxide (E171), Black Iron Oxide (E172) וג'לטין.

ביצד נראות קפסולות ציקלוסרין ותכולת האריזה

קפסולות ציקלוסרין אדומות ואפורות ומגיעות בבקבוקי פלסטיק המכילים 100 קפסולות.

שם היבואן וכתובתו: פרופארם בע"מ, ת.ד. 4046, זכרון יעקב, 30900

A70050-H