

نشرة معلومات للمتعالج

دان تريوم® 25 ملغ كبسولات دان تريوم® 100 ملغ كبسولات صوديوم دانترولين

1. ما هي كبسولات دان تريوم وفي أي حالات يتم استخدامها؟

من فئة العلاج الدوائي – رمز ATC:M03CA01. هذا الدواء هو دواء ذو مفعول مباشر يسبب استرخاء العضلات. ويستخدم لعلاج التشنج الذي يحدث نتيجة للإصابة بأمراض في الدماغ أو في الحبل الشوكي. ويمكن استخدامه بمفرده أو بدمجه مع أدوية أخرى. وهو مفيد بشكل خاص عندما يشكل التشنج عقبة كبيرة أمام إعادة التأهيل. كما يستخدم العلاج أيضاً للوقاية من ارتفاع الحرارة الخبيث (ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم أثناء التخدير).

2. ما الذي يتوجب معرفته قبل تناول كبسولات دان تريوم؟

إذا أخبرك طبيبك عن عدم تحملك لبعض السكريات، تواصل معه قبل تناول هذا الدواء. لا تتناول كبسولات دان تريوم في الحالات التالية:

- إذا كان تعاني من الحساسية (فرط التحسس) لدانترولين الصوديوم أو لأي من المكونات الأخرى في هذا الدواء والمذكورة في القسم 6.
- إذا كنت تعاني من مرض حاد في الكبد.
- إذا كنت لا تحتمل أو تعاني من حساسية (فرط التحسس) للغلوتين، وذلك لاحتواء المنتج على نشا القمح (غلوتين).

في حال وجود أي شك، من الضروري استشارة الطبيب أو الصيدلي.

التحذيرات والإجراءات الوقائية

ينطوي العلاج باستخدام كبسولات دان تريوم على خطر احتمال التسبب للكبد. قد يحدث هذا بين نهاية الشهر الثاني وبداية السنة الأولى من العلاج. يجب أن تتم مراقبة الكبد بشكل دوري سريرياً وبيولوجياً عند العلاج لفترات طويلة. أخبر طبيبك فوراً إذا بدأت تعاني من أعراض الإرهاق، فقدان الشهية، الحكّة، الصداع، الغثيان أو التقيؤ. هذه الأعراض تستدعي وقف العلاج.

لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الجالاكتوز، قصور اللاكتاز اللابي أو متلازمة سوء امتصاص الجلوكوز - جالاكتوز (أمراض وراثية نادرة). يمكن وصف هذا الدواء في حالات الإصابة بمرض السيلياك (حساسية القمح). قد يحتوي نشا القمح على الغلوتين، ولكن كبقايا فقط، وبالتالي يعتبر المنتج آمناً لمرضى السيلياك.

تناول هذا الدواء بحذر في الحالات التالية:

- القصور التنفسي الحاد،
- القصور الحاد في عضلة القلب.

الأدوية الأخرى وكبسولات دان تريوم

يجب عدم تناول هذا الدواء مع أدوية أخرى قد تكون سامة للكبد. أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً أو كنت ستتناول أية أدوية أخرى.

الحمل، الرضاعة، والخصوبة
إذا اكتشفت أنك حامل أثناء فترة العلاج، استشير طبيبك: هو وحده يستطيع ملائمة العلاج لحالتك.
ينصح بعدم الإرضاع إذا كنت تتناولين هذا الدواء.
استشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات
قد يسبب هذا الدواء الدوخة والنعاس سواء تم تناوله بشكل منفرد أو مع أدوية أخرى.

تحتوي كبسولات دانتريوم على اللاكتوز ونشا القمح (غلوتين).

3. طريقة تناول كبسولات دانتريوم؟

قم دوماً بتناول هذا الدواء تماماً كما وصفه لك الطبيب أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي شك.
يتم تحديد الجرعة التي سيتم تناولها من قبل الطبيب. وهذه الجرعة ملائمة لكل مريض بشكل فردي.
يتم تناول الدواء عبر الفم.
تناول الجرعة اليومية على 2 أو 3 مراحل، أثناء الوجبات. على الأغلب لا حاجة لمواصلة العلاج إذا لم يحدث أي تحسن بعد 6 أسابيع من تناول الدواء.
إذا كنت تشعر بأن تأثير كبسولات دانتريوم قوي جداً أو ضعيف جداً، استشر طبيبك أو الصيدلي.
في حال تناولت جرعة أكبر مما ينبغي من كبسولات دانتريوم:
استشر طبيبك أو الصيدلي على الفور. إذا نسيت تناول كبسولات دانتريوم، تناولها حالما تتذكر، ولكن إن تذكرتها في موعد الجرعة التالية، لا تقم بمضاعفة الجرعة. واصل تناولها كالمعتاد. إذا كان لديك أية أسئلة أخرى حول تناول هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال مع جميع الأدوية، قد يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية، ولكن هذه الآثار لا تصيب الجميع .

- نعاس، دوخة، تعب، أو ارتباك.
- تظهر هذه الأعراض مع بداية العلاج وتخف مع الوقت.
- تسمم الكبد (انظر التحذيرات والإجراءات الوقائية)،
- اضطرابات في الجهاز الهضمي: ألم المعدة العصبي، غثيان، تقيؤ، وإسهال،
- احتمال الإصابة بسلس البول بسبب ارتخاء العضلة العاصرة،
- تصبغ البول باللون البرتقالي،
- الطفح الجلدي، الحساسية،
- نادراً: اضطرابات في الدم، قصور القلب.

إذا أصبحت أي من الآثار الجانبية أكثر حدة، أو إذا لاحظت أية آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

التصريح عن الآثار الجانبية

إذا عانيت من أية آثار جانبية، تحدث مع طبيبك أو مع الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أية آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة.
من خلال الإبلاغ عن ردود الفعل السلبية، فإنك تساعد على توفير المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

5. كيفية تخزين كبسولات دانتريوم؟

احتفظ بهذا الدواء بعيداً عن متناول وعن نظر الأطفال.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على العبوة بعد كلمة EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.
ابقي الدواء في شرائط الكبسولات، داخل العبوة الخارجية، بعيداً عن الضوء والرطوبة.
لا ترمي أية أدوية في المصارف أو في المجاري أو مع النفايات المنزلية. اطلب من الصيدلي التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها.
ستساعد هذه التدابير على حماية البيئة.

6. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

تحتوي كبسولات دانتريوم على:

- المادة الفعالة هي صوديوم دانترولين: 0.025 غرام في كل كبسولة من دانتريوم 25 ملغ، و0.100 غرام في كل كبسولة من دانتريوم 100 ملغ.
- المكونات الأخرى هي: أحادي هيدرات اللاكتوز، نشا القمح، النالك، سترات المغنيسيوم. غلاف الكبسولة: جيلاتين، إريثروزين (E127)، أكسيد الحديد، ثاني أكسيد التيتانيوم (E171).

محتويات العبوة الخارجية لكبسولات دانتريوم

تأتي كبسولات دانتريوم 25 ملغ على شكل كبسولات. في علبة تحتوي على 50 كبسولة. كبسولات دانتريوم 100 ملغ تأتي على شكل كبسولات. في علبة تحتوي على 30 أو 50 كبسولة.

المستورد:

بروفارم م.ض.، ص.ب. 4046، زخرون يعقوب، 30900