

بينيميد 500 ملغ

قرص محرز

بروبينيسيد

BENEMIDE® 500 mg

Scored tablet

Probenecid

### تعريف المنتج الطبي

### تركيب الدواء النوعي والكمي

بروبينيسيد ..... 500.00 ملغ

المواد الغير فعالة: ستيرات المغنزيوم, سيليكات غروية غير مائية, كربونات مغنزيوم خفيفة, نشا القمح.

قرص ال- 710 ملغ

الرجاء قراءة هذه النشرة قبل تناول هذا الدواء

- ◆ حافظ/ي على هذه النشرة, ممكن ان تحتاج/ين لقراءتها مجدداً.
- ◆ إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى, أي شكوك, اطلب/ي معلومات إضافية من طبيبك او الصيدلي.
- ◆ لقد تم وصف هذا الدواء لك شخصياً. لا تقم/ تقومي بإعطاءه للآخرين, حتى وإن كانت أعراضهم تشبه تلك التي لديك, لأن ذلك ممكن أن يضرهم.

\* إذا كانت هنالك أي أعراض جانبية, او إذا قمت/ي بملاحظة أي أعراض جانبية غير مُدرجة في هذه النشرة, رجاءً قم/ قومي بمراجعة طبيبك او الصيدلي.

في هذه النشرة:

1. ما هو بينيميد 500 ملغ قرص محرز ومتى يستخدم
2. ماذا عليك ان تعرف/ي قبل تناول بينيميد 500 ملغ قرص محرز
3. كيف تستخدم/ين بينيميد 500 ملغ قرص محرز
4. ما هي الأعراض الجانبية المحتملة؟
5. كيف تخزن بينيميد 500 ملغ أقراص محزرة
6. معلومات إضافية

### الشكل الصيدلاني

قرص محرز, علبة تحتوي على 30 قرص

### الفئة الدوائية

محفز بيلاء حمض اليوريك (م: الجهاز التحركي)

## المالك/ البائع/ المصنّع

BOUCHARA-RECORDATI (مختبرات)

70, Avenue du General de Gaulle, 92800 PUTEAUX

معلومات مفصلة عن هذا المنتج متوفرة في الموقع الإلكتروني ل- ANSM (فرنسا)

1. ما هو بينيميد 500 ملغ قرص محرز ومتى يستخدم

بينيميد 500 ملغ هو قرص مغلف يحتوي على مادة تدعى بروبينيسيد التي تنتمي لمجموعة أدوية تدعى "محفزات بيلاة حمض اليوريك".

هذا المنتج الدوائي ينبغي ان يستخدم لعلاج:

- الم مفاصل في حال عدم وجود نسبة يورات مرتفعة في البول
- ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم
- بالتزامن مع علاج بالبينيسيلين.

### تحذير

متى لا يجوز استخدام هذا المنتج الدوائي

ينبغي ان لا يستخدم هذا المنتج الدوائي في الحالات التالية:

- حساسية لبروبينيسيد او لأحد عناصر هذا المنتج الدوائي
- قصور كلوي حاد
- حصاة يوراثية في الكلى او في المسالك البولية
- إفراغ بولي لليورات يزيد عن 700 ملغ/ 24 ساعة,
- إرتفاع في مستويات حمض اليوريك في الدم خلال امراض دم معينة,
- علاج بميثوتريكسات

إذا كانت لديك حساسية (حساسية مفرطة) للقمح, بسبب وجود نشا القمح.

ينبغي ان لا يستخدم هذا المنتج الدوائي عامةً دون مراجعة الطبيب في حال:

- الحمل او الإرضاع
- العلاج بساليسيلات.

في حال وجود شك من الضروري استشارة طبيبك او الصيدلي.

### تحذيرات خاصة

هذا المنتج الدوائي ليس علاجاً لإلتهاب المفاصل الحاد. في بداية العلاج ينصح بدمجه مع علاج بكونشيسين.

لا ينبغي استخدام هذا المنتج الدوائي دون رقابة طبية.

يمكن تناول هذا الدواء في حالات الداء البطني. نشا القمح ممكن ان يحتوي على غلوتين, لكن فقط بكميات ضئيلة, ولذلك فهو يعتبر أمن للمرضى الذين يعانون من مرض الداء البطني.

### إحتياطات الاستخدام

أبلغ/ي طبيبك في حال لديك قرحة في المعدة لملائمة العلاج.

إلتزم/ي بالنظام الغذائي الموصوف.

قبل بدء العلاج, يمكن ان يطلب طبيبك فحص بول.

أبلغ/ي طبيبك في حال العلاج بساليسيلات.

في حال وجود شك لا تتردد/ي في إستشارة طبيبك او الصيدلي.

## تفاعلات طبية وتفاعلات اخرى

لتجنب التفاعلات بين منتجات طبية مختلفة أخبر/ي طبيبك او الصيدلي بوجود أي علاجات اخرى.

## الحمل – الإرضاع

### الحمل

هذا المنتج الدوائي لا ينصح به أثناء الحمل.

### الإرضاع

تجنبي الإرضاع أثناء تناول هذا المنتج الدوائي

### الرياضيين

يحتوي هذا المنتج الدوائي على مواد فعالة والتي ممكن ان تسبب نتيجة إيجابية في إختبارات الكشف عن المنشطات.

**قائمة معلومات عن المواد الغير فعالة المطلوب معرفتها للإستخدام لدى بعض المرضى: نشا الذرة**

## كيف تستخدم/ين هذا المنتج الدوائي

### الإستخدام

يختلف الإستخدام على حسب العرَض.

في جميع الأحوال الرجاء إلتزم/ي بشدة بإرشادات طبيبك.

### اسلوب وطريقة تناول الدواء

عن طريق الفم

يجب ان يتم بلع الأقراص وقت تناول الطعام.

للأطفال دون السادسة من العمر, إسحق/ي القرص لخلطه مع بعض اللبن او مع سائل.

### مدة العلاج

ممكن ان تستمر لعدة أشهر.

في جميع الأحوال الرجاء إلتزم/ي بشدة بإرشادات طبيبك.

في حال جرعة زائدة

في حال الجرعة الزائدة، أبلغ/ي طبيبك فوراً.

## أعراض جانبية غير مرغوب بها

مثل جميع المستحضرات الدوائية الفعّالة هذا المنتج الدوائي ممكن ان يسبب أعراض جانبية غير مرغوب بها لدى بعض الأشخاص.

الأكثر تكرارية: صداع، فقدان شهية، غثيان، تقيؤ، ألم في اللثة، دوار، كثرة التبول.

أعراض جانبية نادرة: ردة فعل تحسسية مع حرارة، طفحات جلدية، تهيج الجلد، شرى.

نادراً جداً: اضطرابات كبد وكلية، انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء خصوصاً لدى مرضى مع قصور G6PD.

لا تتردد/ي في إستشارة طبيبك أو الصيدلي وإخبارهم بأي أعراض جانبية غير مرغوب بها التي قد لا تكون مُدرجة في هذه النشرة.

يمكنك أيضاً التبليغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة الإسرائيلية. بتبليغك عن الأعراض الجانبية، بإستطاعتك المساعدة بتوفير معلومات إضافية حول سلامة هذا الدواء.

## التخزين

**لا تستخدم/ي الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المذكور على العبوة الخارجية.**

تاريخ إنتهاء الصلاحية يشير الى اخر يوم في الشهر.

**أبق/ي الدواء بعيداً عن متناول أيدي ورؤية الأطفال**

**تعليمات تخزين خاصة**

يجب حفظه دون 25C° درجة مئوية

لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياة الصرف الصحي او مع النفايات المنزلية. إسال/ي الصيدلي كيف يمكنك التخلص من الأدوية الغير مستعملة. هذه الإجراءات سوف تساعد على حماية البيئة.

**المستورد:**

**بروفارم م.ض**

**ص.ب 4046,**

**زخرون يعقوف, 30900**

**رقم التصنيف: A70044-A**