

**דף מידע לטופל**  
**בנמיד® 500 מ"ג**  
**BENEMIDE 500mg**  
**טבלייה**  
**פרובנסיד**

**זיהוי המוצר התרופתי**

**הרכב**

500.00 מ"ג.....Probenecid

- חומרים בלתי פעילים: מגנזיום סטארט, סיליקה קולואידית, מגנזיום קרבונט קל, עמילן חיטה.  
710 מ"ג בטבלייה  
אנא קרא את עלון זה לפני נטילת התרופה
- שמור את העלון במקום בטוח, ייתכן ותהיה צורך לקרוא אותו שוב.
  - במידה ויש לך שאלות נוספות או ספקות בנוגע לתוכן העלון, בקש מידע נוסף מהרופא שלך או מרוקח.
  - תרופה זו נרשמה לך באופן אישי, לטיפול במחלתך. אל תעביר את התרופה לאדם אחר, גם אם נדמה לך כי התסמינים שלו/שלה דומים לשלך, משום שהדבר עשוי לגרום לו/לה נזק.
- \* במקרה והבחנת בהופעתן של תופעות לוואי כלשהן כתוצאה מהשימוש בתרופה או אם הבחנת בתופעות לוואי כלשהן שאינן מצויינות בעלון זה, אנא פנה לרופא או לרוקח שלך לקבלת ייעוץ.

המידע המופיע בעלון זה:

1. מהי טבלייה של בנמיד 500 מ"ג ומתי משתמשים בה?
2. מה עליך לדעת לפני נטילת טבלייה של בנמיד 500 מ"ג?
3. כיצד יש להשתמש בטבלייה של בנמיד 500 מ"ג?
4. מהן תופעות הלוואי האפשריות?
5. כיצד יש לאחסן טבלייות של בנמיד 500 מ"ג?
6. מידע נוסף

**צורת מינון**

טבלייה, חפיסה המכילה 30 טבלייות

**קטגוריית התרופה**

תרופה המגבירה את הפינוי של חומצה אורית (M: מכשור ממונע)

**בעלים/מוכר/יצרן**

BOUCHARA-RECORDATI (מעבדות)  
70, Avenue du General de Gaulle, 92800 PUTEAUX

1. מהי טבלייה של בנמיד 500 מ"ג ומתי משתמשים בה?  
בנמיד 500 מ"ג הינה טבלייה מצופה המכילה חומר הנקרא פרובנסיד המשתייך לקבוצת התרופות הנקראות "תרופות להגברת הפינוי של חומצה אורית".

- יש להשתמש במוצר תרופתי זה לטיפול ב:
- שיגדון, בהיעדר רמה גבוהה של מלחי חומצה אורית בשתן
  - רמה גבוהה של חומצה אורית בדם
  - שילוב עם טיפול בפניצילין

### אזהרה

מתי אין להשתמש במוצר תרופתי זה?

- אין להשתמש במוצר תרופתי זה במקרים הבאים:
- אם קיימת רגישות לפרובנסיד או לאחד ממרכיבי תרופה זו
  - במקרה של אי ספיקת כליות בדרגת חומרה גבוהה
  - אם ידוע על נוכחות של אבני חומצה אורית בכליות או בדרכי השתן
  - אם הפינוי של חומצה אורית בשתן עולה על 700 מ"ג / 24 שעות
  - בעת טיפול בתרופה מטוטרקסאט
  - אם הינך אלרגי (בעל רגישות יתר) לחיטה, בשל נוכחות המרכיב עמילן חיטה

באופן כללי, אין להשתמש במוצר תרופתי זה מבלי להתייעץ עם הרופא המטפל שלך במקרים הבאים:

- אם הינך בהריון או אם את מניקה
- בסמוך לקבלת טיפול בחומצה סליצילית

במקרה של ספק, חשוב מאוד כי תפנה לרופא המטפל שלך או לרוקח לקבלת ייעוץ

### **אזהרות מיוחדות**

מוצר תרופתי זה אינו מהווה טיפול לשיגדון חריף. בשלב ההתחלתי של הטיפול מומלץ לשלבו עם טיפול בקולכיצין.

### **אין ליטול תרופה זו ללא פיקוח רפואי**

במקרים מסויימים עשויה תרופה זו לשמש לטיפול במחלת צליאק. עמילן חיטה עלול להכיל גלוטן, אם כי בכמויות מזעריות בלבד, ולכן התרופה נחשבת כבטוחה לשימוש בחולים הסובלים ממחלת צליאק.

### **אמצעי זהירות שיש לנקוט בעת השימוש בתרופה**

עליך ליידע את הרופא המטפל שלך במקרה והינך סובל מכיבים במערכת העיכול, על מנת שיוכל להתאים את הטיפול למצבך.  
הקפד לאכול על פי תוכנית התזונה שנרשמה עבורך.  
לפני התחלת הטיפול, ייתכן ויבקש הרופא המטפל שלך לערוך בדיקת שתן. יידע את הרופא שלך אם הינך מקבל טיפול בחומצה סליצילית.

במקרה של ספק, אל תהסס לפנות אל הרופא המטפל שלך או אל הרוקח לקבלת ייעוץ

**תגובות בין-תרופתיות ואחרות**  
על מנת להמנע מתגובות לא רצויות בין מוצרים תרופתיים שונים עליך ליידע את הרופא המטפל שלך או את הרוקח לגבי טיפולים אחרים שהינך מקבל.

### **הריון – הנקה**

#### **הריון**

מוצר תרופתי זה אינו מומלץ לשימוש במהלך הריון.

#### **הנקה**

עליך להמנע מהנקה בעת נטילת תרופה זו.

### **ספורטאים**

מוצר תרופתי זה מכיל רכיבים פעילים העשויים לגרום לקבלת תוצאה חיובית בבדיקות לגילוי סמים

**רשימת רכיבים לא פעילים שהמידע לגביהם חיוני לשימוש על ידי חולים מסויימים:**  
עמילן תירס

### **כיצד יש להשתמש במוצר תרופתי זה?**

#### **אופן השימוש**

אופן השימוש בתרופה הוא שונה ממקרה למקרה ותלוי בהתוויה הרפואית

בכל מקרה שהוא, אנא הקפד על מילוי הוראות השימוש בתרופה בדיוק כפי שניתנו לך על ידי הרופא המטפל שלך.

#### **שיטת ואופן מתן התרופה**

מתן פומי (דרך הפה)

יש לבלוע את הטבליות ביחד עם הארוחות

לשימוש בילדים מתחת לגיל 6, יש לרסק את הטבלייה ולערבב אותה במעט יוגורט או נוזל

#### **משך הטיפול**

הטיפול בתרופה עשוי להימשך מספר חודשים

בכל מקרה שהוא, אנא הקפד על מילוי הוראות השימוש בתרופה בדיוק כפי שניתנו לך על ידי הרופא המטפל שלך.

#### **במקרה של נטילת מנת יתר**

במקרה של נטילת מינון יתר מהתרופה, עליך ליידע את הרופא המטפל שלך באופן מיידי.

## **תופעות לוואי / תופעות לא רצויות**

כמו בכל מוצר תרופתי המכיל חומרים פעילים, גם תרופה זו עשויה לגרום להופעתן של תופעות לוואי לא רצויות באנשים מסויימים.

תופעות שכיחות: כאבי ראש, אובדן תיאבון, בחילות, הקאות, כאבי חניכיים, סחרחורת, השתנה תכופה.

תופעות נדירות: תגובה אלרגית המלווה בחום, הופעת פריחה על העור, גירוי בעור, חרלת.

תופעות נדירות מאוד: הפרעות בתפקוד הכבד או הכליות, ספירה נמוכה של תאי דם אדומים (בעיקר בחולים הסובלים מחסר באנזים G6PD).

אל תהסס לפנות לרופא המטפל שלך או לרוקח לקבלת ייעוץ ויידע אותם לגבי הופעתן של כל תופעות לוואי שאינן מצויינות בעלון זה.

## **תנאי אחסון**

אל תשתמש בתרופה לאחר תאריך תפוגה המצויין על גבי האריזה. תאריך תפוגה המצויין על גבי אריזת התרופה מתייחס ליום האחרון של החודש.

**שמור את התרופה מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים**

## **הוראות אחסון מיוחדות**

אחסן בטמפרטורה שמתחת ל-25 מעלות צלזיוס  
אין להשליך תרופות למערכת מי השפכים או יחד עם האשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להיפטר מתרופות שלא נעשה בהן שימוש. נקיטה באמצעים אלו תסייע בהגנה על הסביבה.

## **היבואן:**

פרופארם בע"מ, ת.ד. 4046, זכרון יעקב, 30900