

## ® 500 Probecid منغ

بروبيسيديد

اقرأ هذه النشرة بأكملها بعناية قبل البدء في استخدام هذا الدواء.

- احتفظ بهذه النشرة حيث أنك قد ترغب في الرجوع إليها لاحقاً.
- استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك أي أسئلة أخرى.
- تم وصف هذا الدواء لك شخصياً ولا ينبغي أن يتم إعطائه للآخرين. لأنه قد يضر بهم، حتى إذا كانت الأعراض الخاصة بهم مماثلة للأعراض التي لديك.

- المادة الفعالة هي بروبيسيديد 500 ملغ.
- المكونات الأخرى هي الجيلاتين، نشأ البطاطس، السليكا الغروية اللامائية، حمض الستياريك، التلك، ستيرات المغنيسيوم.
- سعة العبوة 50 قرص

### 1. ما هو بروبيسيديد وما هي دواعي استخدامه؟

يستخدم لتخفيف أعراض القرص. يستخدم أيضاً مصاحباً للمنتجات التي تحتوي على البنسلين لتعزيز تأثير البنسلين.

يعمل بروبيسيديد على تعزيز إفراز حمض اليوريك عن طريق منع إعادة امتصاصه في الكلى، وبهذا يتم خفض مستويات حمض اليوريك في الدم، مما يخفف من أعراض القرص.

ليس لهذا المنتج أي تأثير مباشر على تخفيف الألم. يجب أخذ المسكنات أيضاً في أحوال نوبات القرص الحادة.

يعمل بروبيسيديد أيضاً على منع تعوط البنسلين (مضاد حيوي) عن طريق الكلى. ولهذا في حالات أخذ بروبيسيديد جنباً إلى جنب مع البنسلين يتم احتجاز كمية أكبر من البنسلين في الجسم لفترة أطول.

### 2. قبل أخذ بروبيسيديد

لا تستخدم بروبيسيديد:

- إذا كان لديك حساسية مفرطة (أرجي) من البروبيسيديد أو من أحد مكونات بروبيسيديد الأخرى.
- إذا كنت تعاني من تلف كلوي حاد. يجب أن تبلغ الطبيب بذلك.

كن شديد الحرس عند استعمال بروبيسيديد

- إذا كنت تعاني من تلف الكلى أو قرحة الجهاز الهضمي
- إذا كنت تعاني من البورفيريا
- في أحوال الإصابة بنوبة نقرس حادة، لا تبدأ العلاج قبل هبوط النوبة.
- إذا كان القرص ناجماً عن السرطان أو العلاج الكيميائي.

الحمل

من فضلك استشير طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ أي نوع من الأدوية. مقدار الخبرة المكتسب فيما يخص استخدام بروبيسيديد أثناء الحمل ضئيل. ولهذا، استشير طبيبك قبل استخدام بروبيسيديد أثناء الحمل.

الرضاعة الطبيعية

من فضلك استشير طبيبك أو الصيدلي قبل أخذ أي نوع من الأدوية. ليس معلوماً إذا كان بروبيسيديد يمر إلى حليب الثدي. ولهذا، استشير طبيبك قبل استخدام بروبيسيديد أثناء الإرضاع من الثدي.

الآثار على القدرة على القيادة واستخدام الآلات

يفترض أن بروبيسيديد لا يؤثر على القدرة على القيادة أو استخدام الآلات.

تناول بروبيسيديد مع المنتجات الطبية الأخرى

من فضلك أبلغ طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ/تستخدم أو اخذت/ استخدمت مؤخراً أدوية أخرى، بما فيها تلك التي تم الحصول عليها دون وصفة طبية أو العلاجات الطبيعية.

تجنب الاستخدام المتزامن للمنتجات التي تحتوي على الأسبرين؛ حيث أن ذلك قد يعوق أثر هذا المنتج.

العلاج باستخدام بعض الأدوية المضادة للسرطان، وعلاج اضطرابات جهاز المناعة (الميثوتريكسات)، وبعض الأدوية المضادة للالتهابات للمصابين بالروماتزم (إندوميثاسين، كيتورولاك، نابروكسين)، وبعض مسكنات الألم والصداع (الباراسيتامول)، وبعض مضادات الفيروسات (زيدوفودين) وغيرها من المنتجات الطبية يمكن أن تؤثر أو تتأثر بالعلاج باستخدام بروبيسيديد. ولهذا، استشر طبيبك قبل استخدام المنتجات الطبية الأخرى.

### 3. كيفية استخدام بروبيسيديد

تناول بروبيسيديد دائماً بالضبط كما حدد لك الطبيب. من فضلك استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من أي شيء. الجرعة القياسية للبالغين المصابين بالقرص هي: **الأسبوع 1** – ½ قرص مرتين يومياً؛ بعد ذلك، **1** قرص مرتين يومياً. اشرب كميات كبيرة من الماء أثناء العلاج.

الجرعة القياسية للبالغين أثناء التناول المتزامن مع تناول المنتجات التي تحتوي على البنسلين هي: **2** قرص مرتين يومياً.

يرجى استشارة طبيبك أو الصيدلي في حال شعورك بأن تأثير بروبيسيديد زائد جداً أو قليل جداً.

إذا أخذت بروبيسيديد بجرعة أكثر مما يجب:

اتصل بطبيبك أو بأقرب مستشفى إذا كنت قد أخذت مقدار زائد جداً من بروبيسيديد أو في حال ابتلاع طفلك له بالخطأ. إذا كان لديك أي أسئلة إضافية بشأن هذا المنتج، يرجى الاتصال بطبيبك أو صيدلي.

إذا نسيت أن تأخذ بروبيسيديد:

لا تأخذ جرعة مزدوجة لتعويض عن الجرعة الفائتة.

### 4. الآثار الجانبية المحتملة

يمكن أن ينتج عن تناول بروبيسيديد، مثل جميع العقاقير، آثار

جانبية سلبية. شائعة: الغثيان

نادرة: رد فعل تحسسي مثل الطفح الجلدي.

برجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إذا لاحظت ظهور آثار جانبية لم يتم ذكرها في هذه النشرة.

### 5. كيفية تخزين بروبيسيديد

يتم التخزين في درجة حرارة الغرفة.

يجب إبقاء الدواء خارج نطاق تواجد ومرأى الأطفال.

لأغراض السلامة والحفاظ على البيئة، يجب إعادة الأدوية غير المستخدمة أو المنتهية الصلاحية أو المتبقية إلى الصيدلي ليتولى إعدامها.

المستورد:

نوفولوج م.ض

شارع همعايان 55

موديعين

إسرائيل