

פרובציד® 500 מ"ג

פרובנציד

יש לקרוא בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה זו.

- יש לשמור על עלון זה, מאחר שייתכן כי יתעורר צורך לקרוא בו שוב.
- אם יש לך שאלות נוספות כלשהן, יש לפנות לרופא המטפל או לרוקח.
- תרופה זו נרשמה עבורך באופן פרטני ואין להעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם התסמינים שלהם זהים לתסמינים שלך.

[...]

- **הרכיב הפעיל הוא פרובנציד 500 מ"ג.**
- **הרכיבים הנוספים הם** גילטין, עמילן תפוח אדמה, סיליקה אנהידרית קולואידית, חומצה סטארית, טלק ומגנזיום סטאראט.
- **גודל האריזה:** 50 טבליות

[...]

1. מהו פרובציד ולמה הוא מיועד?

פרובציד משמש להקלה על תסמיני שיגדון. נעשה בו שימוש גם בשילוב תכשירים המכילים פניצילין, להגברת ההשפעה של הפניצילין.

פרובציד מעודד את פינוי החומצה האורית, על ידי כך שהוא מונע את הספיגה מחדש שלו בכליות, ובכך מוריד את רמות החומצה האורית בדם, דבר המקל על החולה את תסמיני השיגדון.

לתכשיר אין השפעה משככת כאבים ישירה. במקרה של התקף שיגדון חריף, יש ליטול משככי כאבים נוסף על פרובציד.

כמו כן, פרובציד מעכב את פינוי הפניצילין (סוג של אנטיביוטיקה) דרך הכליות. לכן, אם פרובציד ניטל יחד עם פניצילין, כמות גדולה יותר של פניצילין נשמרת בגוף לתקופה ממושכת יותר.

2. לפני נטילת פרובציד

אין ליטול פרובציד:

- במקרה של רגישות יתר (אלרגיה) לפרובציד או לכל אחד מהמרכיבים האחרים שהוא מכיל.
- במקרה של נזק כלייתי חמור. יש להודיע על כך לרופא המטפל.

יש לנקוט משנה זהירות עם פרובציד

- במקרה של נזק כלייתי או כיב פפטי
- במקרה של פורפיריה
- בזמן התקף שיגדון חריף. אין להתחיל טיפול לפני חלוף ההתקף.
- אם השיגדון נגרם בשל מחלת סרטן או כימותרפיה.

היריון

יש להיוועץ ברופא המטפל או ברוקח לפני נטילת כל סוג של תרופה.
קיים ניסיון מועט עם פרובציד במהלך היריון. לכן, יש להיוועץ ברופא המטפל לפני השימוש בפרובציד במהלך היריון.

הנקה

יש להיוועץ ברופא המטפל או ברוקח לפני נטילת כל סוג של תרופה.
לא ידוע אם פרובציד עובר לחלב האם. לכן, יש להיוועץ ברופא המטפל לפני השימוש בפרובציד במהלך הנקה.

השפעות על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות

ההנחה היא כי פרובציד אינו משפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות.

נטילת פרובציד יחד עם תכשירים רפואיים אחרים

במקרה של נטילת תרופות אחרות כלשהן או נטילתן לאחרונה, לרבות תרופות ללא מרשם ותרופות טבעיות, יש לדווח על כך לרופא המטפל או לרוקח.

יש להימנע משימוש מקביל בתכשירים המכילים אספירין, מאחר שהדבר עלול לפגוע בהשפעת התכשיר.

טיפול בתרופות אנטי-סרטניות מסוימות, טיפול בהפרעות של מערכת החיסון (מתוטרקסאט), נוגדי דלקת מסוימים לטיפול בשיגרון (ראומטיזם) (אינדומתאצין, קטורולק, נפרוקסן), משככי כאבים מסוימים ותרופות מסוימות לכאבי ראש (פרצטמול), תרופות אנטי-ויראליות מסוימות (זידובודין) ותכשירים רפואיים נוספים עלולים להשפיע על הטיפול בפרובציד או להיות מושפעים ממנו. לכן, יש להיוועץ ברופא המטפל לפני השימוש בתכשיר רפואי אחר כלשהו.

3. כיצד יש להשתמש בפרובציד

תמיד יש ליטול פרובציד בדיוק כפי שהורה לך הרופא המטפל. במקרה של אי ודאות בדבר כלשהו, יש להיוועץ ברופא המטפל או ברוקח. המינון המקובל למבוגרים הסובלים משיגרון הוא: **שבוע 1** - ½ טבלייה פעמיים ביום; לאחר מכן, טבלייה 1 פעמיים ביום. יש להרבות בשתיית נוזלים המהלך הטיפול.

המינון המקובל למבוגרים הניתן בשילוב תכשירים המכילים פניצילין הוא: 2 טבלייות פעמיים ביום.

יש להיוועץ ברופא המטפל או ברוקח אם נדמה לך שההשפעה של פרובציד חזקה מדי או חלשה מדי.

אם נטלת בטעות יותר פרובציד מהמומלץ

אם נטלת בטעות יותר מדי פרובציד או אם ילד נטל את התרופה בטעות, יש לפנות לרופא המטפל או לבית החולים הקרוב. לשאלות נוספות לגבי התכשיר, יש ליצור קשר עם רופא או עם רוקח.

אם שכחת ליטול פרובציד:

אין ליטול מנה כפולה כדי לכפר על מנה שנשכחה.

4. תופעות לוואי אפשריות

כמו כל תרופה, לפרובציד תיתכנה תופעות לוואי.

תופעות לוואי שכיחות: בחילה

תופעות לוואי נדירות: תגובות אלרגיות, כגון פריחה בעור.

אם מופיעות תופעות לוואי כלשהן שלא צוינו בעלון זה, יש לדווח על כך לרופא המטפל או לרוקח.

5. כיצד יש לאחסן פרובציד

יש לאחסן בטמפרטורת החדר.

יש לשמור הרחק ממגע ידם ומטווח ראייתם של ילדים.

מטעמי סביבה ובטיחות, יש להחזיר לרוקח תרופות שלא נעשה בהן שימוש, תרופות שתוקפן פג ותרופות שאין

בהן צורך עוד, לשם השמדתן.

[...]

שם היבואן: נובלוג, רחוב המעיין 55, אזור תעשייה מודיעין, ישראל