

קו-אמילוזיד - טבליות של 2.5 מ"ג/25 מ"ג ו-5 מ"ג/50 מ"ג אמילוריד הידרוכלוריד והידרוכלורוטיאזיד

1. מהן טבליות קו-אמילוזיד ולמה הן משמשות?

שם התרופה שלך הוא טבליות קו-אמילוזיד. תרופה זו מכילה שני מרכיבים פעילים - אמילוריד הידרוכלוריד והידרוכלורוטיאזיד. אמילוריד הידרוכלוריד מסלק עודפי מים ומונע ירידה ברמות אשלגן. הידרוכלורוטיאזיד מסלק עודפי מים מהגוף.

טבליות קו-אמילוזיד מגיעות בשתי רמות חוזק ומשמשות לטיפול באי ספיקת לב, לחץ דם גבוה ואצירת נוזלים עקב מחלת כבד (במיוחד כאשר חשוב לשמור על רמות אשלגן).

2. לפני שתיטול טבליות קו-אמילוזיד

אין ליטול טבליות קו-אמילוזיד במקרים הבאים:

- יש לך אלרגיה (רגישות יתר) לאמילוריד הידרוכלוריד, הידרוכלורוטיאזיד או לכל מרכיב אחר בטבליות קו-אמילוזיד (ראה סעיף 6)
- יש לך אלרגיה לסוג של תכשירים אנטיביוטיים הנקראים סולפונאמידים, כגון סולפמתוקסזול
- הרופא שלך אמר כי יש לך רמות גבוהות של אשלגן, סידן, אוריאה או קריאטינין בדם
- יש לך אי-ספיקת כליות או מחלת כליות או שאינך מסוגל להטיל שתן
- יש לך אי-ספיקת כבד חמורה
- הינך נוטל תוספי אשלגן או תרופות המכילות אשלגן או שאתה צורך כמויות גדולות של מזונות עתירי אשלגן
- הינך נוטל משתנים אוגרי אשלגן, כגון ספירונולקטון או טריאמטרן
- הינך נוטל ליתיום (משמש לטיפול במאניה דיפרסיה)
- יש לך סוכרת (רמות גבוהות של סוכר בדם)
- יש מחלת אדיסון (מחלה של בלוטות יותרת הכליה)
- את בהריון, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מניקה
- הינך צעיר מגיל 18

שוחח עם הרופא שלך לפני נטילת טבליות קו-אמילוזיד במקרים הבאים:

- הינך קשיש או סובל ממחלה קשה
- סבלת לאחרונה מהקאות קשות או משלשול
- יש לך שחמת הכבד ורמות גבוהות באופן חריג של אלקליניות בגוף (אלקלוזיס מטבולי) או שהיו רמות גבוהות של חומצה בגוף (חמצת מטבולית או נשימתית) הנגרמות על ידי מחלת לב או סוכרת שאינה מאוזנת.
- יש לך אצירת נוזלים הגורמת לנפיחות (בצקת עמידה)
- מחלת כבד חמורה
- ליקוי בתפקוד הכלייתי
- הינך נוטל תכשיר דיגיטליס כגון דיגוקסין - משמש לטיפול באי-ספיקת לב וקצב לב בלתי תקין
- הינך סובל משיגדון (מצב שבו יש כמות רבה מדי של חומצת שתן בגוף, מה שגורם לכאבי פרקים)
- הינת עומד לעבור בדיקת העמסת סוכר (יש להפסיק את השימוש בתרופה זו לפחות שלושה ימים לפני הבדיקה).
- הרופא שלך אמר יש לך רמות גבוהות של חומצת שתן, כולסטרול או טריגליצרידים (סוג של כולסטרול) בדם
- יש לך אסתמה חמורה
- הינך סובל מזאבת אדמנתית מערכתית (מחלה שבה המערכת החיסונית תוקפת את רקמות הגוף)
- יש לך סרטן עור או שפיתחת נגע בלתי צפוי בעור במהלך הטיפול. טיפול בהידרוכלורוטיאזיד, בפרט שימוש ארוך-טווח במינונים גבוהים, עשוי להעלות את הסיכון למספר סוגים של סרטן העור והשפתיים (סרטן עור שאינו מסוג מלנומה). בזמן נטילת טבליות קו-אמילוזיד יש לשמור על העור מפני חשיפה לשמש ולקרני UV.

שימוש בתרופות אחרות

אנא ספר לרופא שלך או לרוקח אם הינך נוטל או נטלת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן, כולל תרופות הנרכשות ללא מרשם. התרופות הבאות עשויות להשפיע על הטיפול בטבליות קו-אמילוזיד, או שהטיפול בטבליות קו-אמילוזיד עשוי להשפיע עליהן:

- תרופות המשמשות לטיפול בסרטן הכליה כגון אלדסלאוקין
- נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAID), כגון אספירין או איבופרופן - משמשים להורדה של חום גבוה, להקלת כאבים או לטיפול בדלקת פרקים
- משככי כאבים כגון קודאין, דיהידרוקודאין, דקסטרופרופוקסיפן, דיאמורפין, מורפין, פנטוזצין ופטידין
- תכשירי שרף מחליף אניונים המשמשים להורדת כולסטרול (כגון כולסטיראמין וכולסטיפול) - יש ליטול בהפרש של שעתיים לפחות
- תרופות אנטי-אריטמיות המשמשות לטיפול בקצב לב בלתי תקין, כגון כינידין
- תרופות המשמשות לטיפול בזיהומים חיידקיים, כגון טרימטופרים
- תרופות לטיפול בדיכאון
- (כגון רבוקסטין, נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי מונואמין אוקסידאז - MAOI)
- תרופות לטיפול בסוכרת (כגון כלורפרופאמיד)
- קארבאמזפין, המשמש לטיפול באפילפסיה
- אמפוטריצין ופלוקונאזול, המשמשים לטיפול בזיהומים פטרייתיים
- אלופורינול, המשמש למניעת שיגדון
- תכשירי אנטיהיסטמינים המשמשים לטיפול באלרגיות, כגון אסטמיזול וטרפנאדין
- מעכבי האנזים ACE, כגון אנלפריל, המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה או בבעיות לב
- חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין II, כגון לוסרטן - משמשים לטיפול בלחץ דם גבוה או בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית
- תרופות אחרות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה (למשל, פראזוסין, הידרלאזין, דיאזוקסיד)
- תרופות המשמשות לטיפול במלריה, כגון הלופנטרין
- תרופות המשמשות לטיפול במחלות נפש (כגון פימוזיד וסרטינדול)
- אשלגן, סידן ותוספי ויטמינים.
- גליקוזידים של הלב המשמשים לטיפול באי-ספיקת לב (למשל, דיגוקסין)

- סטראידיים (למשל, קורטיזון והידרוקורטיזון)
 - תרופות משתנות, כגון ספירונולקטון, טריאמטרן או אצטזולאמיד.
 - תרופות המשמשות לטיפול במחלת הפרקינסון (כגון אמאנטאדין, לבדופה)
 - הורמונים או תרופות הפועלות על הורמונים (למשל טרילוסטן, טורמיפן, אסטרוגנים)
 - תרופות המשמשות לדיכוי המערכת החיסונית בעקבות השתלת איבר (כגון ציקלוספורין וטקורולימוס)
 - ליתיום - משמש לטיפול בדיכאון
 - ברביטורטים המשמשים לסדציה ולהרדמה
 - מרפי שרירים מסוג non-depolarising, כגון טובוקורין שמשמש בניתוחים.
 - ספר לרופא שלך אם הינך מתאשפז בבית חולים לצורך ניתוח
 - ניטרטים, לטיפול בתעוקת חזה
 - קרבנוקסולון המשמש לטיפול בכיבי קיבה
- אנא ספר לרופא שלך או לרוקח אם הינך נוטל או נטלת לאחרונה תרופות אחרות כלשהן, כולל תרופות הנרכשות ללא מרשם.

נטילת טבליות קו-אמילוזיד עם מזון ושתייה

אם אתה חש סחרחורת בעת נטילת התרופה, אלכוהול עלול להחמיר תופעות אלו.

הריון

עלייך לספר לרופא אם הינך בהריון או אם את חושבת שאת בהריון. בדרך כלל, במקרה זה הרופא שלך ימליץ לך ליטול תרופה אחרת במקום קו-אמילוזיד, מכיוון שקו-אמילוזיד לא מומלץ לשימוש במהלך ההריון. הסיבה לכך היא שקו-אמילוזיד חוצה את השיליה והשימוש בתרופה לאחר החודש השלישי להריון עלול לגרום להשפעות שליליות על העובר ולמומים מולדים.

הנקה

אמור לרופא שלך אם את מניקה או עומדת להתחיל להניק. קו-אמילוזיד אינו מומלץ עבור אמהות מניקות. יש לפנות לרופא שלך או לרוקח לקבלת ייעוץ טרם נטילת תרופה כלשהי.

נהיגה והפעלת מכונות

תרופה זו עלולה לגרום לך להרגיש סחרחורת, להפחית את הערנות או לפגוע בראייה שלך. אם הינך חווה תופעות אלו, אין לנהוג ברכה או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על מרכיבים מסוימים של טבליות קו-אמילוזיד

תרופה זו מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך חוסר סבילות לסוכרים מסוימים, יש לפנות לרופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד יש ליטול את טבליות קו-אמילוזיד

תמיד יש ליטול טבליות קו-אמילוזיד לפי ההוראות של הרופא שלך. הרופא שלך יחליט מהו המינון המיטבי עבורך. מידע זה יופיע על התווית של הרוקח. יש לבלוע תרופה זו בשלמותה. המנה ההתחלתית הרגילה היא:

לטיפול ביתר-לחץ דם:

- יש ליטול טבליה אחת פעם ביום. הרופא שלך עשוי להחליט להעלות את המינון עד שתי טבליות ליום.

טיפול באי-ספיקת לב:

- יש ליטול טבליה אחת פעם ביום. הרופא שלך עשוי להחליט להעלות את המינון עד ארבע טבליות ליום.

לטיפול באצירת נוזלים במחלת כבד:

- יש ליטול שתי טבליות פעם ביום. הרופא שלך עשוי להחליט להעלות את המינון עד ארבע טבליות ליום. ייתכן שהרופא שלך ירצה לנטר את רמות המלח באמצעות בדיקות דם סדירות, בייחוד אם אתה קשיש או חולה, בכדי לבדוק נכחות של חוסר איזון אפשרי.

ילדים

- תרופה זו אינה מומלצת לשימוש בילדים מתחת לגיל 18.

אם נטלת מינון גבוה יותר של טבליות קו-אמילוזיד מהנדרש

אם אתה (או כל אדם אחר, כולל ילד) נטלת יותר טבליות קו-אמילוזיד ממה שהיית אמור, עליך לפנות לחדר המיון בבית החולים הקרוב ביותר או לרופא באופן מיידי. תמיד יש להביא את האריזה והעלון הזה איתך.

במקרה ששכחת ליטול טבליות קו-אמילוזיד

אם שכחת מנה, יש ליטול אותה ברגע שנזכרת. אם נזכרת במועד הקרוב לנטילה של המנה המתוכננת הבאה, אין ליטול את המנה שהוחמצה. לעולם אין ליטול מנה כפולה בכדי לפצות על זו שהוחמצה.

4. תופעות לוואי אפשריות

בדומה לכל התרופות, טבליות קו-אמילוזיד עלולות לגרום לתופעות לוואי, אם כי לא כל אחד סובל מהן. כמו עם כל תרופה, אנשים מסוימים עלולים לפתח תגובה אלרגית.

אם תחווה כל אחת מהתופעות הבאות, יש להפסיק ליטול טבליות קו-אמילוזיד ולפנות לרופא באופן מיידי:

- **תגובה שלילית חמורה** - סימנים עשויים לכלול דלקת בכלי דם, קשיי נשימה או בליעה, קריסה, אדמומיות, שלפוחיות, קילוף בעור, כאבי שרירים, צמרמורות, תחושת חולי כללית, כיבים בפה, בעיניים או באברי המין.

תופעות לוואי אחרות שדווחו:

- **שינוי במאזן של נוזלים או כימיקלים בגוף** (למשל, נתרן, אשלגן, כלור ומגנזיום) שעלול לגרום לבחילה או הקאה, חולשה, עייפות, עצבנות, חוסר מנוחה, בלבול ועוויתות שרירים.
- **דם:** שינויים בכמות ובסוג של תאי דם הגורמים לנטייה גבוהה יותר לחבורות, דימום באף, דלקת גרון, זיהומים, עייפות קשה, קוצר נשימה במאמץ או חיורון חריג של העור (ייתכן שתצטרך לעבור בבדיקת דם).

- **חילוף חומרים:** התייבשות, שינויים בתיאבון, שיגדון, שינויים ברמות של כימיקלים בגוף (רמה גבוהה של אשלגן בדם, גלוקוז או חומצת שתן או רמה נמוכה של נתרן בדם), גלוקוז בשתן.
- **מערכת העצבים:** קשיי שינה, ישנוניות, בלבול, תגובה מופחתת לגירוי (קהות חושים), חוסר הכרה, עצבנות, דיכאון, כאבי ראש, סחרחורת (ורטיגו), תחושת דקירות, רעד, חוסר מנוחה, מחלת מוח (המאופיינת באובדן תפקוד קוגניטיבי, יכולת להתרכז ושינויים באישיות ברמת ביטוי נמוכה).
- **חושים:** שינויים בראייה, כגון ראייה מטושטשת וצהובה, טעם רע, צלולים באוזניים (טינטון) ועלייה בלחץ תוך-עיני.
- **לב:** כאבי חזה (תעוקת חזה), קצב לב לא סדיר (הפרעות קצב), מהיר (טכיקרדיה) או דפיקות לב חזקות (פלפיטציות), סחרחורת במעבר למצב עמידה בשל לחץ דם נמוך, דלקת של כלי דם (necrotising angiitis).
- **עור:** פריחה, בליטות לא סדירות ומוגבהות עם גירוד חמור (סרפדת), הזעה מופרזת, נשירת שיער, הסמקה, רגישות העור לאור השמש או לאור מלאכותי (למשל, מיטות שיזוף), חבורות ושינוי צבע בעור (ארגמנט). תדירות לא ידועה: סרטן העור והשפתיים (סרטן עור שאינו מסוג מלנומה).
- **נשימה:** קשיי נשימה, שיהוקים, גודש באף, שיעול, נוזל בריאות ודלקת ריאות (פנאומוניטיס).
- **קיבה ומעיים:** תחושת בחילה או הקאה, שלשולים, עצירות, כאבי בטן ותחושה של מלאות, גזים, שפעול כיבים בקיבה, עוויתות בטן, דימום בקיבה, דלקת בבלוטת הרוק, ויובש בפה.
- **כבד ולבלב:** דלקת בלב (פנקריאטיטיס), שינויים בתפקוד הכבד וצהבת (הצהבה של העור או העיניים).
- **שרירים ומפרקים:** התכווצויות שרירים, כאבי רגליים, כאבי גב, כאבי מפרקים, כאבי צוואר וכתפיים.
- **מערכת המין והשתן:** קימה בלילה לצורך הטלת שתן, כאבים בזמן הטלת שתן, השתנה תכופה או בכמות גדולה, אי-שליטה במתן שתן, כאבים בשלפוחית השתן, פגיעה בתפקוד הכלייתי, אי-ספיקה כלייתית או דלקת בכליות, אי-יכולת להשיג זקפה או לשמור עליה וכן חוסר עניין במין.
- **אחר:** כאבים בחזה, עייפות, הרגשה תחושת חולי, חולשה, צמא וחום.

5. כיצד יש לאחסן את טבליות קו-אמילוזיד

- הרחק מטווח ראייתם ומהישג ידם של ילדים.
- אין לאחסן במטפרטורה מעל 25°C. יש לאחסן במיכל המקורי ולא להעביר למכל אחר.
 - אין ליטול לאחר תאריך התפוגה המופיע על התווית; תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.
- אין להשליך תרופות עם מי שפכים או עם פסולת ביתית. שאל את הרוקח כיצד יש להשליך תרופות שאינן נדרשות יותר. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכילות טבליות קו-אמילוזיד

מרכיבים פעילים: אמילוריד הידרוכלוריד (2.5 מ"ג או 5 מ"ג) והידרוכלורתיאזיד (25 מ"ג או 50 מ"ג).
 מרכיבים אחרים: לקטוז, calcium phosphate dibasic, עמילן תירס, עמילן תירס pregelatinised, מגנזיום סטיארט, מים מטוהרים.

כיצד נראות טבליות קו-אמילוזיד ותכולת האריזה:

טבליות קו-אמילוזידהן טבליות בצבע קרם בתוך אריזות בליסטר אטומות או מיכלי פלסטיק פוליאיתילן.