

هلوبيريدول 5 ملغ،

أقراص

نشرة الرزمة: معلومات للمريض

1 ما هو هلوبيريدول ولم يُستخدم

ينتمي هلوبيريدول إلى مجموعة الأدوية التي تُدعى "مضادات الدّهان".

يُستخدم هلوبيريدول لدى البالغين والمراهقين والأطفال في حالات الأمراض التي تؤثر على طريقة تفكيرك وشعورك وتصرفك. إنها تشمل مشاكل في الصحة العقلية (مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب) ومشاكل السلوك.

هذه الأمراض قد تجعلك:

- تشعر بالبلبلة (الهديان)
- ترى أو تسمع أو تشتم أو تشتم أمور غير موجودة (هلوسات)
- تؤمن بأمور غير صحيحة (أوهام)
- تتنابك الشكوك بشكل غير اعتيادي (ارتياب)
- تشعر بحماسة كبيرة أو هيجان أو اندفاع أو تهور أو فرط نشاط
- تكون عدائيًا أو هجوميًا أو عنيفًا بشكل كبير.

في حالة المراهقين والأطفال، يُستخدم هلوبيريدول لعلاج الفصام لدى المرضى من عمر 13 إلى 17 عامًا، ولمعالجة مشاكل السلوك لدى المرضى من عمر 6 إلى 17 عامًا.

يُستخدم هلوبيريدول أيضًا:

- لدى المراهقين والمرضى من عمر 10 إلى 17 عامًا ولدى البالغين في حالة الحركات أو الأصوات التي لا يمكنك التحكم بها (تشنجات لارادية)، مثلاً، في حالة متلازمة توريت الحادة
- لدى البالغين للمساعدة على التحكم بالحركات في مرض هنتنغتون.

يُستخدم هلوبيريدول أحياناً عندما لا تؤثر أدوية أو علاجات أخرى أو تُسبب أعراضاً جانبية غير مقبولة.

2 ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول هلوبيريدول

لا تتناول هلوبيريدول إذا:

- لديك حساسية لهلوبيريدول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6)
- لديك وعي أقل بالأمور من حولك أو أصبحت ردود فعلك بطيئة بشكل غير اعتيادي
- أنت مُصاب بمرض باركينسون
- لديك نوع من الخرف يُدعى "خرف الجسم ليوي"
- لديك شلل فوق النوى المترقي (PSP)
- لديك حالة قلبية تُدعى "نطاق QT ممدد" أو أي مشكلة أخرى في وتيرة قلبك تُظهر علامات غير اعتيادية في أ.ك.ج. (الكتروديوغرام)
- لديك فشل قلبي أو تعرضت مؤخراً لوبئة قلبية
- لديك مستوى منخفض من البوتاسيوم في دمك والذي لم تتم معالجته

- أنت تتناول أي من الأدوية المذكورة في "الأدوية الأخرى وهلوبيريديول – لا تتناول هلوبيريديول إذا كنت تتناول بعض الأدوية من أجل".

لا تتناول هذا الدواء إذا انطبق عليك أي مما ذكر أعلاه. إذا لم تكن متأكدًا، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هلوبيريديول.

### تحذيرات ووقايات

#### أعراض جانبية حادة

قد يُسبب هلوبيريديول مشاكل في القلب ومشاكل في التحكم بالجسم أو حركات الأطراف وعارض جانبي حاد يُدعى "المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان". كما قد يسبب ردود فعل تحسسية حادة وخثرات دموية. يجب أن تكون واعيًا للأعراض الجانبية الحادة خلال تناولك لهلبيريديول لأنك قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ. راجع "انتبه للأعراض الجانبية الحادة" في القسم 4.

#### المسنون والمصابون بالخرف

تم الإبلاغ عن ارتفاع بسيط في حالات الموت والجلطة لدى المسنين المصابين بالخرف التي يتناولون أدوية مضادة للذهان. تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هلوبيريديول إذا كنت مُسنًا، خاصة إذا كنت مصابًا بالخرف.

#### تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك:

- وتيرة قلب بطيئة أو مرض قلبي أو يوجد فرد من عائلتك القريبة قد توفي بشكل مفاجئ بسبب مشاكل القلب
- ضغط دم منخفض أو الشعور بدوار عند الجلوس أو الوقوف
- مستوى منخفض من البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو "إلكتروليت" آخر) في دمك. سيقرر طبيبك كيفية معالجة هذا
- كان لديك نزيف في الدماغ أو أخبرك طبيبك أنك أكثر عرضة للإصابة بجلطة مقارنة بأشخاص آخرين
- صرع أو كانت لديك انقباضات (اختلاجات)
- مشاكل في الكلى أو الكبد أو الغدة الدرقية لديك
- مستوى مرتفع من بروتين "برولكتين" في دمك أو السرطان، مما قد يسبب في مستويات عالية من البرولكتين (مثل سرطان الثدي)
- تاريخ من خثرات الدم أو شخص آخر في عائلتك لديه تاريخ من الخثرات في الدم
- إكتئاب أو متلازمة ثنائية القطب وبدأت بالشعور بالإكتئاب.

قد توجد حاجة إلى مراقبتك عن قرب وقد تتغير كمية هلوبيريديول التي تتناولها.

إذا لم تكن متأكدًا إذا كان أي من المذكور أعلاه ينطبق عليك، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هلوبيريديول.

#### المراجعات الطبية

قد يرغب طبيبك بإخضاعك لإلكتروليتات البوتاسيوم أو المغنيزيوم (إ.ك.ج.) قبل أو خلال العلاج بهلوبيريديول. الإلكتروليتات هي مواد يقيس النشاط الكهربائي لقلبك.

#### فحوص الدم

قد يرغب طبيبك بفحص مستويات البوتاسيوم أو المغنيزيوم (أو "إلكتروليت" آخر) في دمك قبل أو خلال علاجك بهلوبيريديول.

#### الأطفال دون سن 6 سنوات

لا يجب استخدام هلوبيريديول لدى الأطفال دون سن 6 سنوات. هذا لأنه لم تتم دراسته كما يجب لدى هذه الفئة العمرية.

#### أدوية أخرى وهلوبيريديول

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

#### لا تتناول هلوبيريديول إذا كنت تتناول أدوية معينة لعلاج:

- مشاكل في نبض قلبك (مثل أمبودارون، دوفيتيليد، ديزوبيراميد، درونيدارون، إيبوتيليد، كويندين وسوتالول)

- الإكتئاب (مثل سيتالوبرام واسيتالوبرام)
- الذهان (مثل فلوفنزين، ليفومبرومزين، بيرفنزين، بيموزيد، بروكلوربيرازين، برومازين، سرتندول، تيوريزدين، تريفلوبيرزين، تريفلوبرومزين وزيبيراسيدون)
- تلوثات بكتيرية (مثل أزيترومييسين، كلاريتروميسين، أريترومييسين، ليفوفلاكسين، موكسيفلوكساسين وتيليتروميسين)
- تلوثات فطرية (مثل بنتميدين)
- مالاريا (مثل هلو فنترين)
- غثيان وتقيؤ (مثل دولسترون)
- سرطان (مثل تورميفين وفندينتيب).

كما يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول بيبريديل (لألم الصدر أو لتخفيف ضغط الدم) أو ميتادون (مسكن للألم أو لمعالجة الإدمان على الدواء).

هذه الأدوية قد تزيد من مشاكل القلب، لذلك تحدث إلى طبيبك إذا كنت تتناول أي منها ولا تتناول هلوبيريديول (راجع "لا تتناول هلوبيريديول إذا").

**قد تحتاج إلى مراقبة خاصة إذا كنت تتناول الليثيوم وهلوبيريديول في نفس الوقت.**

أخبر طبيبك على الفور وأوقف تناول الدواءين إذا حدثت لديك:

- حمى لا يمكنك وصفها أو حركات لا يمكنك التحكم بها
- بلبلة، فقدان الذاكرة، صداع، مشاكل في التوازن وتشعر بالنعاس.

إنها علامات حالة حادة.

**قد تؤثر بعض الأدوية على الطريقة التي يعمل فيها هلوبيريديول أو قد يزيد من مشاكل القلب**

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول:

- ألبرازولام أو بوسبيرون (للقلق)
- دولكسيتين، فلويوكسيتين، نيفازودون، باروكسيتين، سيرترالين، عشبة القديس يوحنا (هيبريكوم، برفوراتوم) أو فنلأكسين (للإكتئاب)
- بوبروبيون (للإكتئاب أو للمساعدة على إيقاف التدخين)
- كاربامازيبين، فينوبريتال أو فينيتون (للصرع)
- ريفاميسين (للتلوثات البكتيرية)
- إتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول (لمعالجة متلازمة كوشينغ)
- إيندينافير، ريتونافير أو ساكينافير (لفيروس نقص المناعة البشرية أو HIV)
- كلوربرومزين أو برومترين (للغثيان والتقيؤ)
- فيراباميل (لضغط الدم أو مشاكل القلب)

كما يجب أن تخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى لتخفيف ضغط الدم مثل أقراص الماء (مبيلات)

قد يُضطر طبيبك إلى تغيير جرعتك من هلوبيريديول إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية.

**قد يؤثر هلوبيريديول على طريقة عمل الأنواع التالية من الأدوية**

أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية من أجل:

- تهدنتك أو مساعدتك على النوم (مهدئات)
- ألم (مسكنات ألم قوية)
- الإكتئاب (مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات)
- تخفيف ضغط الدم (مثل غوناتيدين وميتلادوبا)
- ردود فعل تحسسية حادة (أدرينالين)

- اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) أو الخدر (تُعرف أيضًا باسم "محفزات")
- مرض باركينسون (مثل ليفودوبا)
- مميغات الدم (فينينديون).

تحدث إلى طبيبك قبل تناول هلوبيريديول إذا كنت تتناول أي من هذه الأدوية.

## هلوبيريديول والكحول

قد يؤدي تناول الكحول خلال تناولك لهلوبيريديول إلى شعورك بالنعاس وانخفاض درجة اليقظة لديك. هذا يعني أنك يجب أن تكون حذرًا حيال كمية الكحول التي تشربها. تحدث إلى طبيبك حول شرب الكحول خلال تناول هلوبيريديول وأخبر طبيبك بالكمية التي تشربها.

## الحمل والرضاعة والخصوبة

الحمل – إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنك حاملاً أو تنوين الحمل، استشيري طبيبك. قد ينصحك طبيبك بعدم تناول هلوبيريديول خلال حملك.

قد تحدث المشاكل التالية لدى الأطفال حديثي الولادة للأمهات اللواتي تناولن هلوبيريديول في الأشهر الـ 3 الأخيرة من حملهم (الثالث الأخير):

- ارتعاشات في العضلات، عضلات صلبة أو ضعيفة
- الشعور بالنعاس أو الاضطراب
- مشاكل في التنفس أو الإرضاع.

لا تعرف الوتيرة الدقيقة لهذه المشاكل. إذا تناولت هلوبيريديول خلال الحمل أو طُور أولادك أي من هذه الأعراض الجانبية، اتصلي بطبيبك.

الرضاعة – تحدثي إلى طبيبك إذا كنت مرضعة أو تنوين الإرضاع. هذا لأن كميات صغيرة من الدواء قد تتسرب إلى حليب الأم ومنه إلى الطفل. سيقاشر طبيبك معك مخاطر وفوائد الإرضاع خلال تناول هلوبيريديول.

الخصوبة – قد يزيد هلوبيريديول من مستويات هرمون يُدعى "برولكتين"، مما قد يؤثر على الخصوبة لدى النساء والرجال. تحدثي/ي إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا.

## القيادة واستخدام الماكينات

قد يؤثر هلوبيريديول على قدرتك على القيادة واستخدام الأدوات والماكينات. قد تؤثر الأعراض الجانبية، مثل الشعور بالنعاس، على يقظتك، خاصة عندما تبدأ بتناول الدواء أو بعد جرعة مرتفعة. لا تقد مركبة أو تستخدم أي أدوات أو ماكينات من دون مناقشة الأمر مع طبيبك أولاً.

## هلوبيريديول 5 ملغ، أقراص تحتوي على لاكتوز

إذا أخبرك طبيبك بأنك لا تتحمل بعض أنواع السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا المنتج الدوائي

## هلوبيريديول 5 ملغ أقراص تحتوي على تراتزين (E102) وأزوروبين، كارموزين (E122)

قد يُسبب ردود فعل تحسسية.

## هلوبيريديول 5 ملغ أقراص يحتوي على ملون 4R أحمر (E124)

قد يُسبب ردود فعل تحسسية.

- المرضى الذين لا يتحملون اللاكتوز يجب أن ينتبهوا إلى أن هلوبيريديول يحتوي على كمية صغيرة من اللاكتوز. إذا أخبرك طبيبك أنك قد لا تتحمل بعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

- كما يجب على المرضى الانتباه إلى أن 5 ملغ أقراص يحتوي على تارترازين (E102) وأزوروبين، كارموزين (E122). قد تُسبب هذه ردود فعل تحسسية.

### 3 كيفية تناول هلوبيريديول

تناول دائمًا هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. تأكد مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

#### ما الكمية التي يجب أن تتناولها

سيخبرك طبيبك بعدد الأقراص التي يجب تناولها ولأي فترة زمنية. كما سيخبرك طبيبك إذا يجب تناول هلوبيريديول مرة أو أكثر في اليوم. قد تحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تبدأ بالشعور بالتأثير الكامل للدواء. سيعطيك طبيبك عادة جرعة منخفضة للبدء ومن ثم سيعُدّل هذه الجرعة بما يلائمك. من المهم جدًا أن تتناول الكمية الصحيحة.

إن جرعة هلوبيريديول الخاصة بك تعتمد على:

- عمرك
- الحالة التي يتم معالجتها لديك
- ما إذا توجد مشاكل في كليتيك أو كبدك
- أدوية أخرى تتناولها.

#### البالغين

- ستتراوح جرعتك عادة ما بين 0.5 ملغ و10 ملغ في كل يوم.
- قد يقوم طبيبك بتعديلها حتى إيجاد الجرعة الملائمة لك بالشكل الأفضل.
- الجرعة الأعلى التي يتوجب على البالغين تناولها تعتمد على الحالة التي تتم معالجتها لديك وتتراوح بين 5 ملغ و20 ملغ في كل يوم.

#### المسنون

- سيبدأ المسنون عادة بجرعة 0.5 ملغ في كل يوم أو نصف أدنى جرعة للبالغين.
- من ثم سيتم تعديل عدد الأقراص التي تتناولها إلى أن يجد الطبيب الجرعة الأكثر ملاءمة لك.
- الجرعة الأعلى التي يجب أن يتناولها المسنون هي 5 ملغ في كل يوم إلا إذا يقرر الطبيب الحاجة إلى جرعة أعلى.

#### الأطفال والمراهقون ما بين 6 و17 سنة

- ستتراوح جرعتك عادة ما بين 0.5 ملغ و3 ملغ في كل يوم.
- المراهقون حتى عمر 17 عامًا الذين تتم معالجتهم للفصام أو مشاكل سلوكية قد يحصلون على جرعة أكبر، حتى 5 ملغ في كل يوم.

#### تناول هلوبيريديول

- هلوبيريديول مُخصص للاستخدام الفموي.
- ابلع الأقراص مع بعض الماء.

#### إذا تناولت جرعة هلوبيريديول أكثر مما يجب

إذا تناولت جرعة هلوبيريديول أكبر مما تم إخبارك أو تناول شخص آخر هلوبيريديول، تحدث إلى طبيب أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في مستشفى بأسرع ما يمكن.

#### إذا نسيت تناول هلوبيريديول

- إذا نسيت تناول جرعة، تناول جرتك التالية كالمعتاد. من ثم أكمل تناول دواءك كما أخبرك طبيبك.
- لا تتناول جرعة مزدوجة.

## إذا أوقفت تناول هلوبيريديول

ما عدا الحالات التي يخبرك طبيبك بخلاف ذلك، يجب أن توقف تناول هلوبيريديول بشكل تدريجي. الإيقاف المفاجئ للعلاج قد يؤدي إلى تأثيرات مثل:

- الغثيان والتقيؤ
- صعوبة في النوم.

اتبع دائمًا توصيات الطبيب بعناية.

إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

## 4 أعراض جانبية ممكنة

كما هو حال كل الأدوية، قد يُسبب هذا الدواء أعراضًا جانبية، على الرغم من أنها قد لا تصيب الجميع.

### انتبه للأعراض الجانبية الخطيرة

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أو كانت لديك شكوك حول أي مما يلي. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ.

### مشاكل في القلب

- وتيرة قلب شاذة – هذا يوقف القلب عن العمل بشكل طبيعي وقد يُسبب بفقدان الوعي.
- وتيرة قلب سريعة شاذة
- دقات قلب زائدة

مشاكل القلب ليست شائعة لدى الأشخاص الذين يتناولون هلوبيريديول (قد تؤثر على 1 من بين 100 شخص). حدثت حالات من الموت الفجائي لدى المرضى الذين يتناولون هذا الدواء، لكن الوتيرة الدقيقة لحالات الموت هذه غير معروفة. السكتة القلبية (توقف القلب عن النبض) حدثت أيضًا لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للذهان.

مشكلة حادة تُدعى "المتلازمة البيئية للدواء المضاد للذهان". إنها تسبب ارتفاع الحرارة، تصلب شديد في العضلات، بلبلة وفقدان الوعي. إنها نادرة لدى الأشخاص الذين يتناولون هلوبيريديول (قد تؤثر على 1 في 1000 شخص).

### مشاكل التحكم بحركات الجسم أو الأطراف (اضطراب خارج الهرمي)، مثل:

- حركات الفم واللسان والفك وأحيانًا الأطراف (خلل الحركة المتأخر)
- الشعور بالتململ أو صعوبة في الثبات، ازدياد حركات الجسم
- حركات جسم بطيئة أو منخفضة، حركات هز ودوران
- اختلاجات في العضلات أو تصلب، تغيير في المشية
- عدم القدرة على الحركة
- فقدان القدرة على التعبير في الوجه الذي يبدو أحيانًا كالتمثال.

إنها شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين يتناولون هلوبيريديول (قد تؤثر على أكثر من 1 في 10 أشخاص). إذا حدثت لديك أي من هذه الأعراض، قد تحصل على دواء إضافي.

### ردود الفعل التحسسية الحادة قد تشمل:

- انتفاخ الوجه أو الفم أو اللسان أو الحلق
- صعوبة في البلع أو التنفس
- طفح يُسبب الحكة (شرى)

إن رد الفعل التحسسي ليس شائعًا لدى الأشخاص الذين يتناولون هلوبيريديول (قد يؤثر على 1 في 100 شخص).

**خثرات دم في الأوردة، خاصة في الساقين (تخثر الوريد العميق أو DVT)** ز تم الإبلاغ عن هذه لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للدهان. علامات تخثر الوريد العميق في الساق تشمل الانتفاخ، الألم أو الاحمرار في الساق، لكن قد تنتقل الخثرة إلى الرئتين مما يُسبب ألم في الصدر وصعوبة في التنفس. خثرات الدم قد تكون حادة، لذا أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أي من هذه المشاكل.

أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت أي من الأعراض الجانبية الحادة أعلاه.

#### أعراض جانبية أخرى

أخبر طبيبك إذا لاحظت أو كنت تشك في أي من الأعراض الجانبية التالية.

**شائعة جدًا** (قد تؤثر على أكثر من 1 بين 10 أشخاص):

- الشعور بالانفعال
- صعوبة في النوم
- وجع رأس.

**شائعة** (قد تؤثر على 1 من بين 10 أشخاص):

- مشاكل نفسية حادة، مثل تصديق أشياء ليست حقيقية (أوهام) أو رؤية أو الشعور أو سماع أو شم أشياء غير موجودة (هلوسة)
- اكتئاب
- ضغط عضلات شاذ
- الشعور بدوخة، يشمل عند الجلوس أو الوقوف
- الشعور بالنعاس
- حركات العينين نحو الأعلى أو حركات عينين سريعة لا يمكنك التحكم بها
- مشاكل في النظر مثل الرؤية المبهمة
- ضغط دم منخفض
- غثيان، تقيؤ
- إمساك
- فم جاف أو زيادة البلغم
- طفح جلدي
- عدم القدرة على التبول أو إفراغ المثانة بشكل كامل
- صعوبة في الانتصاب أو الحفاظ عليه (عجز جنسي)
- اكتساب الوزن أو خسارته
- تغييرات تظهر في فحوص الدم الخاصة بالكبد.

**غير شائعة** (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 شخص):

- تأثيرات على خلايا الدم – تعداد منخفض لكل أنواع خلايا الدم، بما فيها انخفاضات خطيرة لخلايا الدم البيضاء وتعداد منخفض "للصفيحات" (الخلايا التي تساعد الدم على التخثر)
- الشعور بالبلبلة
- فقدان الرغبة الجنسية أو انخفاض الرغبة الجنسية
- اختلاجات (نوبات)
- تصلب العضلات والمفاصل
- تشنجات في العضلات، اختلاجات أو انقباضات لا يمكنك التحكم بها، بما في ذلك تشنجات في الرقبة تسبب دوران الرأس إلى جهة واحدة
- مشاكل في المشي
- قصور في التنفس
- التهاب في الكبد أو مشكلة في الكبد تُسبب اصفرار الجلد أو العينين (اليرقان)
- ارتفاع حساسية الجلد لأشعة الشمس

- حكة
- تعرّق مفرط
- تغييرات في الدورة الشهرية (الحيض)، مثلاً عدم ظهور الدورة الشهرية، أو دورة شهرية طويلة وثقيلة ومؤلمة
- إنتاج غير متوقع لحليب الثدي
- ألم أو انزعاج في الصدر
- ارتفاع في حرارة الجسم
- انتفاخ بسبب السوائل المتراكمة في الجسم.

نادرة (قد تؤثر على 1 من بين 1000 شخص):

- مستوى مرتفع لهرمون "برولكتين" في الدم
- مسالك هوائية ضيقة في الرئتين مما يسبب صعوبة في التنفس
- صعوبة أو عدم القدرة على فتح الفم
- مشاكل في ممارسة الجنس.

تم أيضًا الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية لكن وتيرتها الدقيقة غير معروفة:

- مستوى مرتفع من "الهرمون المضاد لتدفق البول" في الدم (متلازمة إفراز غير ملائم للهرمون المضاد للبول)
- مستوى منخفض للسكر في الدم
- انتفاخ حول علبة الصوت أو اختلاج قصير في الأوتار الصوتية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في التحدث أو التنفس
- فشل كبدي مفاجئ
- انخفاض تدفق الصفراء في قناة الصفراء
- جلد يتقشر أو ينقشر
- التهاب في الأوردة الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى طفح في الجلد مع ظهور بقع صغيرة حمراء أو ليلية
- انحلال نسيج العضل (رابدوميوليزيس)
- انتصاب متواصل ومؤلم للعضو الذكري
- ازدياد حجم الصدر لدى الرجال
- انخفاض حرارة الجسم

## 5 كيفية تخزين هلوبيريديول

احفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر ومتناول الأطفال.

لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على الشريط أو الكرتونة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

يُحفظ في درجة حرارة دون 25 مئوية. يُحفظ في علبته الأصلية بعيداً عن الضوء.

لا تتخلص من أي دواء في دورة المياه أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. هذه الخطوات ستساعد على حماية البيئة.

## 6 محتويات الرزمة ومعلومات أخرى

ما تحتوي أقراص هلوبيريديول:

- المادة النشطة هي هلوبيريديول، 5 ملغ
- المكونات الأخرى هي لاكتوز، بوفيدون، نشا الذرة، مغنيزيوم ستيريات (E572)، وحمض ستيريك
- قرص 5 ملغ يحتوي أيضاً على صبغات حمضية لامعة أخضر BS (E142)، تارترازين (E102)، أزرق ذو براءة اختراع V (E131) وأزوروبين، كارمازين (E122)

شكل أقراص هلوبيريديول ومحتوى الرزمة:

- قرص 5 ملغ هو ثنائي الحذب باللون الأخضر الفاتح مع علامة 4S2 على جهة واحدة
- المنتج متوفر برزم بحجم 25، 28، 50، 56، 84، 100، 250، 500 أو 1000 قرص. قد لا يتم تسويق كل الأحجام.

المستورد: نوفولوج، شارع همعيان 55، المنطقة الصناعية موديعين، اسرائيل.